

## PROCOLO AGB de ECOTOMOGRAFÍA OBSTÉTRICA (cualquier trimestre)

### (Información para médicos tratantes)

#### Objetivos:

- Vitalidad fetal
- Presentación fetal
- Biometría fetal y cálculo de percentil en relación a edad gestacional según curva nacional de Alarcón y Pittaluga (a partir de semana 24)
- Placenta: localización y aspecto
- Volumen de líquido amniótico

**Vía del examen:** abdominal.

**Nombre del examen:** Ecotomografía Obstétrica, código 0404006

#### DESCRIPCIÓN DEL EXAMEN:

##### **FRECUENCIA CARDIACA FETAL**

**PRESENTACIÓN:** cefálica, podálica o transversa. Dorso izquierda, derecha, anterior o posterior.

**BIOMETRIA FETAL:** Diámetro Biparietal (DBP), circunferencia craneana (CC), circunferencia abdominal (CA) y longitud femoral (LF). LCN se informará en caso de ser  $\leq 84$  mm.

En base a estas mediciones, se realiza estimación de peso fetal. Posteriormente se asigna percentil de crecimiento según curva nacional de Alarcón y Pittaluga (a partir de las 24 semanas de embarazo), correlacionando peso fetal estimado con edad gestacional.

En los casos en que la estimación de peso fetal (EPF) resulte bajo el percentil 10, es necesario solicitar evaluación Doppler materno-fetal.


En caso de presentar una caída en el carril de la curva de crecimiento fetal o si la EPF resulta en percentil inferior a 25, se sugiere seguimiento ecográfico con evaluación Doppler materno-fetal.

**PLACENTA:** Se describe localización y aspecto según clasificación de Grannum.

En casos que la placenta impresione de inserción baja al evaluar por vía abdominal, se sugiere solicitar una ecotomografía vía vaginal para determinar con exactitud la inserción placentaria, medir a cuántos mm se localiza el margen placentario inferior del OCI, y buscar eventuales signos de acretismo (en especial cuando coexista cicatriz uterina y placenta anterior baja) o vasa previa.

**LÍQUIDO AMNIÓTICO:** Se evalúa subjetivamente su volumen. Si impresiona anormal, se estimará la cantidad mediante Índice de Líquido Amniótico (ILA). Alternativamente, se puede realizar la medición única del bolsillo vertical mayor.

**CORDÓN UMBILICAL:** Se observar la presencia de 3 vasos.

		
DBP y circunferencia craneana	Circunferencia abdominal	Longitud femoral
		
Líquido amniótico, placenta	Cordón umbilical	Curva crecimiento fetal

En este examen no se efectúa una evaluación morfológica fetal (Guía Perinatal Chile 2015).

Fecha: Agosto 2016

Autores: Dr Fernando Viñals, Dra Constanza Saint-Jean