

ECOTOMOGRAFÍA OBSTÉTRICA DOPPLER del TERCER TRIMESTRE (30-34 semanas):

(información para pacientes)

¿En qué consiste la ecotomografía Doppler de tercer trimestre?

Los objetivos específicos de este examen son:

- realizar mediciones de crecimiento fetal, estimar el peso del bebé y calcular si el peso es correcto en relación a las semanas de embarazo, otorgando un percentil de crecimiento en base a curvas nacionales.
- Revisar extensamente la anatomía fetal, buscando anomalías de manifestación tardía durante la gestación (o sea, que pueden no haberse manifestado en el 2º trimestre). Algunas de ellas son: hidrocefalia, microcefalia, malformaciones del cuerpo calloso, hemorragias cerebrales, estenosis de las válvulas cardíacas, miocardiopatías, hernia diafragmática, obstrucciones intestinales, enfermedades quísticas renales, enfermedades esqueléticas, tumores de cualquier sitio del feto, etc.
- Se evalúa también la localización y aspecto de la placenta, la cantidad de líquido amniótico y se mide la longitud del cuello uterino.
- Finalmente, se examina con Doppler color ambas arterias uterinas maternas, para evaluar el flujo sanguíneo hacia la placenta, y una arteria del cordón umbilical y una arteria cerebral fetal, con el objetivo de evaluar el bienestar fetal.

¿Cuándo se realiza este examen?

Entre las 30 y 34 semanas

Técnica:

Vía abdominal y vaginal